

# 核醫靜脈攝影

10

## ( Venography )

國軍台中總醫院 核子醫學科

### ◎ 核醫靜脈攝影的目的：

經臨床醫師的評估，懷疑病患可能有深部靜脈栓塞的可能，藉由此項檢查可以診斷深部靜脈是否栓塞。

### ◎ 檢查方法：

1. 先在雙腳的腳背上打針，安置靜脈留置針。
2. 在雙腳膝蓋下方與腳踝上方各綁上止血帶。
3. 隨及由靜脈留置針上注入核醫藥物，同時進行腳底至肺部的掃描，掃描過程將逐一解開止血帶。
4. 5 分鐘後再取延遲影像。
5. 視情況加照肺部影像。整體掃描時間約 20 分鐘。

### ◆ 注意事項：

1. 如果您有懷孕的可能，能暫時不宜接受此項檢查，請先告知我們。
2. 檢查當天請穿簡便拖鞋，並請保持雙腳乾淨，不需禁食。
3. 腳腫時不易於打針，過程也可能較耗時，請多忍耐與配合。
4. 掃描過程因止血帶束縛，雙腳有腫脹酸痛感，請多加忍耐盡量不動。以提高影像品質。

\*有任何問題歡迎與核醫科聯絡

聯絡電話：04-23923789