

核醫肝膽道掃描

7

(Tc-99m DISIDA Cholescintigraphy)

國軍台中總醫院 核子醫學科

◎ 核醫肝膽道掃描的主要目的：

1. 急性膽囊炎之評估。
2. 疑似慢性膽道疾患之評估。
3. 膽道總管阻塞之評估。
4. 膽汁逆流之評估。
5. 膽汁漏泄之評估。
6. 先天性膽道異常之評估。例如：膽道閉鎖
7. 肝膽系統之功能性分析等。

◎ 檢查方式及注意事項：

1. 如果您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行此項檢查，請告知我們。
2. 檢查前需禁食 4 小時以上，但不宜超過 24 小時。疑似膽道閉鎖之嬰孩，檢查前數天宜口服促進膽汁排泄藥物（由小兒醫師評估）。
3. 檢查時，直接至核醫科靜脈注射核醫藥物，取 5、15、30、45、60、120、240 分鐘之肝臟及腹部影像。若第 4 小時仍不見小腸之放射活性，則必須延遲照影至 6 小時，甚至 24 小時之影像。
4. **檢查期間不可進食！**除特殊情況，才由技術人員告知進食。
5. 檢查過程應盡量不動，以提高影像品質。

*有任何疑問歡迎與核醫科聯絡

聯絡電話：04-23923789