

尊重生命



發揚醫德

藥 - 您 健康



普栓達

Pradaxa

使用藥品，請遵照正確用法、用量，以確保您的用藥安全。

此衛教單張並未包含所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師



藥品介紹

藥品名稱	中文名	成分
Pradaxa	普栓達	Dabigatran etexilate

作用：

為抗凝血劑，可延長血液凝固時間，以及預防血栓的產生。



用藥指導

如何服用藥物：

本藥請依照醫師或藥師指示的用法用量與給藥時間，勿任意更改。

忘記服藥時：

1. 超過原本吃藥時間的 6 個小時內立即服用。
2. 超過原本吃藥時間 6 個小時以上則當天份本藥「不需」再服用。
3. 絕對不可一次吃兩天份的藥量。

◇ 藥師的叮嚀：

1. 在服用本藥之前，應告知醫師過去病史，尤其是出血問題(潰瘍或經期過長、經血量過大)、糖尿病、肝腎疾病、高血壓、癲癇、關節炎、甲狀腺機能異常及最近有否感染、開刀等。
2. 計畫懷孕或孕婦或授乳婦女請於開始服藥前告知醫師。
3. 盡量避免易流血之行為(以軟毛牙刷取代硬毛牙刷)；若須進行牙科檢查或手術時，必須告知醫師正服用此藥。
4. 不得於治療期間同時併服其他會影響凝血的藥物，例如：阿斯匹靈、非類固醇類止痛藥。
5. 藥物置於室溫下貯存，儲存在原包裝並避免潮濕，勿存放於冰箱中，以免影響藥效。

6. 服用本藥的患者，仍然可以從事一些安全的運動，例如：慢跑、游泳，這些運動也可以幫助血液循環，但會有身體衝撞的劇烈運動，則應該避免，以減少受傷機會。
7. 盡量避免飲酒。
8. 服用藥物需將整粒膠囊搭配溫開水吞服，請勿弄破、咀嚼或取出膠囊內顆粒服用。

◇ **可能的副作用：**（藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。）

消化不良、胃部不適、胃食道逆流、噁心。

國軍臺中總醫院 藥劑科
台中市太平區中山路二段 348 號
TEL：04-23933786
TEL：04-23934191 轉 525420、525421
FAX：04-23910450
E-mail：drug-info@803.org.tw