

尊重生命



發揚醫德

藥 - 您 健康



瑞樂沙旋達碟

Relenza

Rotadisks

使用藥品，請遵照正確用法、用量，以確保您的用藥安全。

此衛教單張並未包含所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師



藥品介紹

藥品名稱	中文名	成分
Relenza	瑞樂沙	Zanamivir
Rotadisks	旋達碟	


適應症：RELENZA 適用於治療及預防成人及兒童(≥ 5 歲)之 A 型及 B 型流行性感冒。

用法用量(治療流行性感冒)：


1. 僅可使用隨藥提供的碟型吸入器以經口吸入的方式投入呼吸道。
2. 建議劑量為連續 5 天，每天 2 次，每次吸入 2 劑。

注意事項

1. 在將藥劑裝上碟型吸入器前，不可刺破任何一個泡殼。
2. 未使用時可將 ROTADISK 留在碟型吸入器上；不過請等到準備吸入藥物前再刺破泡殼。
3. 請保持碟型吸入器的清潔，使用後請以紙巾擦拭吸嘴，並在未使用時將藍色外蓋裝回原位。



1. 移除藍色外蓋。



2. 抓住滑盤向外拉出，直到停下為止。




3. 輕壓白色滑盤兩側的指握部分，將滑盤取出。



4. 盡量掀開上蓋，以確保能徹底刺破泡殼。



5. 將白色滑盤推回裝置主體內部。



4. 將一組新的RELENZA ROTADISK放上轉盤。



7. 吐氣後，從吸嘴快速地深吸一口氣；然後儘量憋住這口氣約幾秒鐘。



8. 盡量向外拉出白色滑盤(勿將其完全取出)，然後將它推回原位(出現完整泡殼)。

9. 重複步驟6與步驟7以吸入藥物，在吸入完整劑量的藥物後(通常為2個泡殼)，請以紙巾擦拭吸嘴，並將藍色外蓋裝回原位，保持清潔。

或可至下列網址觀看操作影片：

<http://www.youtube.com/watch?v=2I8jTB1SVCY>

<https://www.youtube.com/watch?v=7XA23fw0LXg>



本品不可貯存於溫度超過 30°C 以上的處所，另請依醫囑使用完整個藥物療程，切勿自行停藥，有任何問題請撥打“免付費民眾疫情通報及諮詢專線 1922(或撥打 0800-001922)洽

詢”。



國軍臺中總醫院 藥劑科
台中市太平區中山路二段 348 號
TEL：04-23933786
TEL：04-23934191 轉 525420、525421
FAX：04-23910450
E-mail：drug-info@803.org.tw